



Памятка по вакцинации дошкольников в Свердловской области

Подготовка ребенка перед проведением вакцинации:

- Объяснить ему, что его ждет у врача (медицинского работника дошкольного учреждения);
- Не пугать ребенка уколами, а честно предупредить, что будет немного больно, но недолго;
- Договориться о вознаграждении за храбрость, если это необходимо;
- Если планируется прививка ОПВ (оральная полиомиелитная вакцина), то за 1 час до и 1 час после прививки нежелательно пить или принимать пищу, так как это может снизить эффективность вакцинации;

После вакцинации:

- Нужно 30 минут находиться в медицинском учреждении для контроля реакций немедленного типа и отслеживать возникновение таких симптомов как зуд, обморок, рвота, крапивница (появление высыпаний), затрудненное дыхание или одышка.
- Родители предупреждаются о возможных реакциях на сделанные вакцины, как часто и в какие сроки после вакцинации они возникают, что нужно делать при их возникновении.

Перед прививкой НЕ НУЖНО

- Сдавать анализы или проходить обследования у узких специалистов.
- Ограничивать контакты и менять рацион питания ребенка.
- Проводить подготовку при помощи лекарств.
- Отменять прием препаратов, назначенных лечащим врачом (за редким исключением, когда врач об этом сообщит)

Нормальные реакции после вакцинации неживыми вакцинами:

- В первые 1–3 суток после вакцинации: повышение температуры, недомогание, потеря аппетита, раздражительность, рвота, головная боль, реакция в месте инъекции (боль, отек, покраснение), увеличение близлежащих лимфоузлов.
- Реакция возникает в 5–10 % случаев.
- Лечение не требуется (только симптоматическая терапия при необходимости), реакции самостоятельно проходят в течение 2–5 дней.

Нормальные реакции после вакцинации живыми вакцинами:

- В первые 1–3 суток после вакцинации возможно незначительное покраснение в месте введения вакцины.
- С 5 по 21 день после вакцинации: повышение температуры, недомогание, потеря аппетита, раздражительность, рвота, головная боль, реакция в месте инъекции (покраснение, менее выраженное, чем при введении неживых вакцин).
- Также возможны легкие катаральные проявления, увеличение лимфоузлов, сыпь, боль в суставах, отек в околоушной или подчелюстной областях.
- Лечение нормальных реакций не требуется (только симптоматическая терапия при необходимости), они самостоятельно проходят в течение 2–5 дней.

Ежегодно проводятся

Вакцинация против гриппа дети с 6 месячного возраста

Туберкулинодиагностика (проба Манту или Диаскинтест)

Администрация Сысертского городского округа
03.04.2023
Вх. № 5556

Вакцинация проводится в соответствии с:

- 157-ФЗ от 17.09.1998 г.
- Приказом №1122н от 06.12.2021г.
- Приказом №1811-п от 11.08.2022г.

Новорожденные в первые 24 часа жизни:
Первая вакцинация против гепатита В

Новорожденные на 3 - 7 день жизни:
Вакцинация против туберкулеза

Дети 1 месяц:
Вторая вакцинация против гепатита В

Дети 2 месяца:

- **Первая вакцинация против пневмококковой инфекции**
- **Первая вакцинация против ротавирусной инфекции**

Дети 3 месяца:

- **Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка**
- **Первая вакцинация против полиомиелита**
- **Первая вакцинация против гемофильной инфекции типа b**
- **Вторая вакцинация против ротавирусной инфекции**

Дети 4,5 месяца:

- **Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка**
- **Вторая вакцинация против гемофильной инфекции типа b**
- **Вторая вакцинация против полиомиелита**
- **Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции**
- **Третья вакцинация против ротавирусной инфекции**

Дети 6 месяцев:

- **Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка**
- **Третья вакцинация против гепатита В**
- **Третья вакцинация против полиомиелита**
- **Третья вакцинация против гемофильной инфекции типа b**

Дети 9 месяцев:

- **Первая вакцинация против менингококковой инфекции**
- **Первая вакцинация против ветряной оспы**

Дети 12 месяцев:
Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита

Дети 13 месяцев
Вторая вакцинация против менингококковой инфекции

Дети 15 месяцев (1 г. 3 мес.)

- **Ревакцинация против пневмококковой инфекции**
- **Первая вакцинация против клещевого энцефалита**

Дети 18 месяцев (1 г. 6 мес.):

- **Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка**
- **Первая ревакцинация против полиомиелита**
- **Ревакцинация против гемофильной инфекции типа b**

Дети 20 месяцев (1 г. 8 мес.):

- **Вторая ревакцинация против полиомиелита**
- **Первая вакцинация против гепатита А**

Дети 21 месяц (1 г. 9 мес.):
Вторая вакцинация против клещевого энцефалита

Дети 26 месяцев (2 г. 2 мес.)
Вторая вакцинация против гепатита А

Дети 33 месяцев (2 г. 9 мес.)
первая ревакцинация против клещевого энцефалита

Дети 6 лет

- **Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита**
- **Третья ревакцинация против полиомиелита**
- **Вторая вакцинация против ветряной оспы**